

Gentile

Signora/e

.....

E' invitata a presentarsi il

giorno

Per l'esecuzione

dell'esame

Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'esame, qualora fosse indicata l'esecuzione del **MEZZO DI CONTRASTO ENDOVENOSO**, si richiede:

- Digiuno da almeno 4 ore;
- Parametri ematochimici (**GLICEMIA, AZOTEMIA, CREATININEMIA**), non antecedenti a **3 MESI**, per la dimostrazione della corretta funzionalità renale.
- Documentazione clinica e radiologica precedente.
- Assenza di allergie note in anamnesi. In caso di diatesi nallerghica nota è necessaria una premedicazione farmacologica, di seguito esplicitata.

PREMEDICAZIONE FARMACOLOGICA PER PAZIENTI A RISCHIO DI SVILUPPARE REAZIONI AVVERSE AI MEZZI DI CONTRASTO PER INDAGINI RADIOLOGICHE.

- 13 ore prima: Prendisone (DELTACORTENE FORTE) 25 mg. Per 2 os.
- 7 ore prima : Prendisone 50 mg. Per os.
- 1 ora prima : Prendisone 50 mg. Per os. + Farganesse 1 fiala da 50 mg. i.m. Oppure Maleato (TRIMETON) 1 FIALA DA 10 MG. i.m.