

NUM	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISPOSTA CORRETTA
1	La Legge 38 del 15 marzo 2010 afferma all'articolo 7 comma 1 che vi è l'obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno di quale documento?	cartella clinica	non è riportato alcun obbligo	esclusivamente nella cartella infermieristica	nessuna delle risposte è corretta	A
2	Secondo il profilo professionale dell'infermiere, le aree previste per la formazione post base e la pratica specialistica sono:	sanità pubblica, pediatria, psichiatria, geriatria, area critica	sanità pubblica, medicina, chirurgia, pronto soccorso, area critica	sanità pubblica, ostetricia, pediatria, ortopedia-traumatologia, area critica	sanità pubblica, pediatria, medicina-chirurgia, geriatria, area critica	A
3	Quali sono le modalità di presa in carico previste dal modello assistenziale del Primary Nursing?	si tratta di un'assistenza personalizzata per ogni singolo paziente	un infermiere ha la responsabilità di identificare i bisogni e problemi e di pianificare e valutare i relativi interventi	un infermiere ha la responsabilità di pianificare l'assistenza. Per l'attuazione degli interventi può avvalersi di altri colleghi	tutte le risposte sono corrette	D
4	Gli obiettivi assistenziali devono essere formulati:	come problema congruente con la diagnosi infermieristica	come risultato generale per orientare e guidare tutta l'equipe infermieristica	come descrizione del comportamento atteso al termine del processo di assistenza	come un'indicazione per orientare il personale di supporto	C
5	Nel linguaggio di management, il termine stakeholder identifica:	soggetti portatori di interessi	soggetti interni ad una iniziativa economica	soggetti non aventi interessi	soggetti esterni ad una iniziativa economica	A
6	Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti l'utilizzo di guanti è falsa:	indossare i guanti dopo aver effettuato l'igiene delle mani	indossare i guanti verificando che non siano troppo stretti o eccessivamente larghi sui polpastrelli o sul palmo della mano	rimuovere i guanti dopo ogni procedura in cui può aver avuto luogo una contaminazione	è superfluo effettuare l'igiene delle mani dopo aver rimosso i guanti	D
7	Relativamente al ricorso alla contenzione fisica, indicare la risposta falsa:	nessuna delle risposte è corretta	la prescrizione di contenzione fisica è sempre a cura del medico e viene registrata in cartella clinica	si procede ad attivare la contenzione fisica della persona assistita qualora vengano osservati comportamenti a rischio di lesione per se o per altri	la persona assistita contenuta fisicamente deve essere monitorata costantemente	A
8	L'Evidence Based Practice è:	un particolare metodo statistico applicato alla ricerca condotta da medici	un approccio assistenziale basato sulla qualità percepita dal paziente	un approccio clinico fondato sulla valutazione e sul buon utilizzo delle informazioni che provengono dalla ricerca nelle decisioni cliniche	un modello di personalizzazione dell'assistenza	C
9	La media è:	la somma di tutti i valori disponibili diviso il numero di rilevazioni	il numero di osservazioni che appare più frequentemente	il numero che compare al centro dei valori osservati	il numero di osservazioni che appare meno frequentemente	A
10	Cosa si intende per antisepsi:	un insieme di norme atte a impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili	un insieme di norme atte a distruggere e rallentare la moltiplicazione dei germi patogeni	un processo che permette l'eliminazione di ogni essere vivente comprese le spore	la detersione eseguita mediante l'uso di saponi liquidi ad alto potere detergente	B

NUM	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISPOSTA CORRETTA
11	Cosa valutano le scale unidimensionali del dolore?	l'intensità	l'irradiazione	la sede	la sede e l'intensità	A
12	Per reazione avversa da farmaco si intende:	l'insieme degli effetti collaterali legati all'assunzione della normale dose di farmaco	qualsiasi effetto non previsto o non desiderato, non necessariamente nocivo, legato all'azione farmacologica di una sostanza	qualsiasi reazione nociva, non intenzionale, determinata da un farmaco alle dosi normalmente utilizzate nell'uomo per la profilassi, la diagnosi e la terapia	reazioni eccessive portate da particolari anticorpi (reagine o IgE) nei confronti di sostanze abitualmente innocue come ad esempio farmaci	C
13	Quale dei seguenti FANS svolge anche attività antiaggregante piastrinica?	nimesulide	paracetamolo	ibuprofene	acido acetil salicilico	D
14	Quale delle seguenti alterazioni è tra le più frequenti complicanze croniche del diabete?	Gotta	Retinopatia	Ipertiroidismo	Insufficienza surrenalica	B
15	In un paziente con ileostomia le feci:	presentano consistenza liquida con elevato contenuto enzimatico	vengono emesse solo se si effettuano irrigazioni ad intervalli di 12-24 ore	vengono emesse solo se si effettuano irrigazioni ad intervalli di 6-8 ore	presentano consistenza normale anche se non sempre sono formate	A
16	La frattura nella persona anziana è la più importante causa di:	senilità e mortalità	disabilità e mortalità	senilità, istituzionalizzazione	disabilità e senilità	B
17	Indicare quali possono essere le possibili complicanze della emotrasfusione :	fenomeni allergici	reazioni emolitiche	infezioni	tutte le risposte sono corrette	D
18	A quale categoria di farmaci appartengono le benzodiazepine?	diuretici	miocardiotonici	sedativi	antiaritmici	C
19	Cos'è la nocicezione?	la manifestazione di stimoli odorosi	un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole	la ricezione, trasmissione ed elaborazione centrale dello stimolo doloroso	la soglia minima del dolore	C
20	Cos'è un T.I.A.?	trombosi improvvisa acuta	trombosi istantanea acuta	attacco ischemico transitorio	turba ischemica acuta	C
21	In caso di stravasamento di una sostanza o farmaco da un catetere venoso periferico, quali sono le attività da mettere in pratica?	interrompere la somministrazione, informare il medico, non rimuovere l'accesso venoso prima di aver aspirato la maggior quantità possibile di sostanza o di farmaco, procedere al riposizionamento del catetere in altra sede	interrompere la somministrazione, informare il medico, non rimuovere l'accesso venoso prima di aver aspirato la maggior quantità possibile di sostanza o di farmaco, riutilizzare l'accesso senza problemi	rimuovere prontamente l'ago ed applicare acqua calda	rimuovere prontamente l'ago e posizionare del ghiaccio	A

NUM	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISPOSTA CORRETTA
22	Devo somministrare 600 mg di ampicillina. Sono a disposizione fiale di ampicillina 1 grammo da diluire con 3 ml. Quanti ml devo utilizzare?	1,8 ml	1 ml	4 ml	0,5 ml	A
23	Individuare quale tra le affermazioni inerenti la tricotomia preoperatoria è corretta:	non depilare il paziente a meno che i peli in prossimità del sito d'incisione non interferiscano con la procedura chirurgica	accorciare i peli o radere solo l'area d'incisione chirurgica	effettuare la depilazione immediatamente prima dell'intervento chirurgico	tutte le risposte sono corrette	D
24	Identificare in quali errori può incorrere l'infermiere nella somministrazione farmacologica:	errata identificazione del paziente	errata via di somministrazione	errato dosaggio	tutte le risposte sono corrette	D
25	Individua le azioni da prevedere nel piano di dimissione ad un paziente diabetico insulino-dipendente:	istruire la persona assistita circa lo scopo della dieta e dell'attività fisica	istruire la persona assistita circa la modalità di somministrazione dell'insulina	istruire la persona assistita al fine di riconoscere i segni e sintomi di ipoglicemia	tutte le risposte sono corrette	D
26	Cos'è l'escara?	sangue deleucocitato	un ormone antidiuretico	una vitamina	una placca di tessuto necrotico	D
27	Quale mitto di urina bisogna prendere per eseguire un'analisi batteriologica?	il mitto intermedio	il mitto iniziale	il mitto terminale	il mitto intermedio e quello terminale	A
28	Quale procedura è particolarmente utile adottare in caso di paziente allettato?	la mobilitazione	la fisioterapia	l'eliminazione degli sfregamenti	tutte le alternative sono corrette	D
29	Secondo la classificazione EPUAP, in una lesione da pressione al terzo stadio si assiste a degenerazione e necrosi	del tessuto muscolare e osseo	del tessuto cutaneo	del tessuto cutaneo e sottocutaneo con possibile estensione fino alla fascia muscolare ma senza oltrepassarla	del tessuto cutaneo, sottocutaneo e di tutta la fascia muscolare	C
30	Nella misurazione della temperatura timpanica, qual è la variabile che non può modificare l'attendibilità del risultato?	presenza di cerume	ambiente esterno molto freddo	ambiente esterno molto caldo	nessuna di queste variabili modifica il risultato della misurazione della temperatura timpanica	B