

NUM	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISPOSTA CORRETTA
1	A che anno risale l'emanazione del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro?	2008	2010	2012	2014	A
2	Il personale obiettore può rifiutarsi di prestare assistenza antecedente o conseguente all'intervento diretto, che determina l'interruzione della gravidanza alle donne che abortiscono?	solo in alcune Regioni	in alcuni casi	no	solo se qualcun altro può prestare assistenza al posto loro	C
3	La fase di valutazione nella pianificazione assistenziale infermieristica:	si basa sugli obiettivi del piano di assistenza	si effettua all'inizio e alla fine della presa in carico	si effettua solo alla dimissione della persona assistita	ha una moderata rilevanza procedurale	A
4	Il metodo attualmente più diffuso per la valutazione del rischio di movimentazione dei pazienti ospedalizzati nelle strutture sanitarie è:	il metodo NIOSH	il metodo MAPO	la misura dinamometrica	la valutazione del numero dei posti letto	B
5	Un rapporto numerico infermieri-pazienti è un elemento indicativo di:	adeguatezza	appropriatezza clinica	appropriatezza organizzativa	nessuna risposta è corretta	C
6	Lo strumento avente lo scopo di sintetizzare le principali raccomandazioni per uniformare le pratica clinica ai risultati della ricerca è:	l'istruzione operativa	la cartella clinica	la linea guida	la procedura	C
7	Negli studi in " doppio cieco":	la selezione del campione è probabilistica	sia il paziente, sia l'operatore non conoscono il trattamento somministrato	l'identità dei soggetti selezionati è mantenuta anonima	il paziente non conosce lo scopo del trattamento	B
8	Alla base della metodologia di analisi proattiva vi è l'idea:	che l'errore non è prevedibile	che l'errore è prevedibile	che gli errori sono a volte prevedibili e a volte no	nessuna risposta è corretta	B
9	Che cos'è l'epidemiologia di una malattia?	il periodo che passa dal contagio alla manifestazione della malattia	la distribuzione sociale della malattia	la tecnica per prevenire la malattia	la modalità di diffusione della malattia	B

NUM	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISPOSTA CORRETTA
10	Fra gli strumenti che hanno mostrato la maggiore utilità nella valutazione del rischio di caduta di un paziente si annovera:	la scala di Likert	la scala di Cheops	la scala ADL di Katz	la scala di Conley	D
11	Le raccomandazioni che orientano gli operatori sono definite:	linee guida	tecniche	procedure	conoscenze	A
12	La definizione più appropriata di Risk Management è:	il processo che porta alla valutazione e alla misura degli effetti sulla salute di un fattore di rischio	lo studio epidemiologico sperimentale con valutazione di efficacia di un intervento preventivo	il processo che conferisce alle popolazioni i mezzi per assicurare un maggior controllo sul loro livello di salute e migliorarlo	l'identificazione del livello di rischio, eliminazione o riduzione dell'esposizione e continuo monitoraggio del livello di rischio individuale e collettivo	D
13	Cosa producono i fibroblasti?	fibre muscolari	fibre reticolari	fibre elastiche e collagene	tutte le alternative sono corrette	C
14	Da quale delle seguenti condizioni è caratterizzato l'aumento della pressione arteriosa differenziale?	ipertensione nefrovascolare	stenosi aortica	stenosi polmonare	insufficienza aortica	D
15	Gli atti ventilatori/minuto che compie un adulto in condizioni normali sono:	10-15	20-25	16-20	19-23	C
16	I battiti cardiaci/minuto in un adulto in condizioni normali sono:	30-50	60-80	90-120	>90	B
17	Il BCG viene utilizzato come vaccinazione:	anticarbonchiosa	antitubercolare	antifungina	antitetanica	B
18	Il segno più affidabile di una trombosi profonda è:	edema distale dell'arto	senso di peso e di tensione	dilatazione delle vene superficiali	rossore e infiammazione del tessuto sottocutaneo	A
19	Il sintomo più evidente di una peritonite è:	dolore spontaneo che si aggrava con la palpazione dell'addome	contrattura a quadrante	rigidità diffusa dell'addome	shock ipovolemico relativo	B

NUM	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISPOSTA CORRETTA
20	Il termine neurolettico:	indica un'azione di stimolazione del farmaco sul SNC	indica le capacità di certi farmaci di ridurre la tensione nervosa e neurovegetativa producendo rilassamento	indica le patologie per le quali certi farmaci sono risultati efficaci	raggruppa tutti i farmaci attivi sul sistema nervoso	B
21	Devo somministrare 350 mg di vancomicina. Vi sono flaconi da 500 mg di antibiotico da diluire ed 1 fiala di solvente da 10 ml. Quanti ml vanno somministrati?	7 ml.	9 ml.	4,5 ml.	6,5 ml.	A
22	Quale di queste strategie non è una strategia di prevenzione del rischio di cadute in ospedale?	educazione della persona assistita circa il rischio di caduta	rilevare il rischio di caduta del paziente	interventi multifattoriali e multidisciplinari	posizionare le sponde del letto	D
23	Indicare quale tra gli ausili in elenco non deve essere utilizzato nella prevenzione delle lesioni da pressione:	superfici antidecubito a pressione alternata	superfici antidecubito a cessione d'aria	cuscini e cunei	ciambelle e velli	D
24	In una persona assistita sottoposta a insulino terapia è importante:	massaggiare con cura dopo ogni iniezione di insulina	riscaldare l'insulina prima dell'iniezione	eseguire la rotazione delle sedi di iniezione di insulina	nessuna risposta è corretta	C
25	Quale di queste affermazioni inerente la rimozione del catetere vescicale è corretta?	il catetere vescicale deve essere rimosso dopo 48 ore dall'applicazione	il catetere vescicale deve essere rimosso dopo 7 giorni dall'applicazione	il catetere vescicale deve essere rimosso non appena cessa l'indicazione al suo mantenimento	il catetere vescicale deve essere rimosso dopo il controllo dell'urinocultura	C
26	Per eseguire correttamente le ventilazioni con il pallone autoespansibile, comunemente conosciuto come pallone di AMBU (Auxiliary Manual Breathing Unit), si deve:	iperestendere il capo	posizionare la maschera sul volto del paziente	premere dolcemente il pallone	tutte le risposte sono corrette	D
27	Nel caso in cui una persona assistita sottoposta a puntura lombare presenti cefalea, quali sono le precauzioni da attuare?	fare assumere alla persona assistita la posizione semiseduta	fare assumere alla persona assistita la posizione prona	fare assumere alla persona assistita la posizione supina	farlo deambulare precocemente	C

NUM	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISPOSTA CORRETTA
28	In caso di liberazione inefficace delle vie aeree correlata ad aumentata produzione di muco e secrezioni dense, è necessario:	ridurre al minimo il tasso di umidità ambientale	far assumere un litro di acqua al giorno al paziente	insegnare esercizi di respirazione profonda e tosse efficace	somministrare per via endovenosa farmaci antibiotici ad ampio spettro	C
29	Indicare quando è necessario applicare la procedura per la corretta identificazione del paziente:	somministrazione di farmaci	somministrazione di sangue ed emocomponenti	effettuazione di prelievi di sangue o di altri campioni biologici per gli esami clinici	ogni qualvolta deve essere effettuata una prestazione alla persona assistita	D
30	Durante l'inserimento del sondino nasogastrico la persona assistita deve essere istruita a :	assumere posizione supina e deglutire al passaggio del sondino	tenere il capo esteso all'indietro e deglutire al passaggio del sondino	tenere il capo inclinato in avanti e deglutire al passaggio del sondino	tenere il capo in posizione naturale e deglutire al passaggio del sondino	C