

NUM	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISPOSTA CORRETTA
1	La legge n. 42 del 1999 sostituì la denominazione professione sanitaria ausiliaria in:	lavoro in ambito sanitario	professione socio-sanitaria	professione sanitaria	professione ausiliaria	C
2	Che cos'è un codice deontologico?	un mansionario da consultare per sapere come comportarsi in una data situazione	un repertorio di comportamenti in cui si devono trovare tutte le risposta	un insieme di regole e principi adottati da una professione e che ne orientano il comportamento	una norma etica che stabilisce comportamenti ben precisi in situazioni controverse per il professionista	C
3	La teoria dei bisogni, nelle discipline infermieristiche, è un modello teorico elaborato da:	D. Snell	V. Henderson	A. Maslow	J. Travelbee	B
4	Non è un sistema di classificazione dell'assistenza infermieristica:	il NIC	il DRG	il NOC	il NANDA	B
5	I LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) sono entrati in vigore per la prima volta in Italia nel:	1978	1992	1999	2002	D
6	Le tecniche di una Root Causes Analysis sono:	i 5 perché e la mappa dei processi	spina di pesce e la mappa dei processi	la mappa dei processi e i 5 perché	spina di pesce, i 5 perché e la mappa dei processi	D
7	Nell'anziano il rischio di cadute è dovuto essenzialmente a:	alterazioni vestibolari	alterazioni visive	alterazioni della propriocezione	tutte le alternative sono corrette	D
8	Nella metodologia di analisi e prevenzione del rischio, quale delle seguenti metodologie si propone di individuare le cause che hanno permesso il verificarsi di un errore?	analisi proattiva	analisi reattiva	analisi passiva	stima del rischio	B
9	Nella sperimentazione clinica, viene definito gruppo di controllo il gruppo:	di pazienti oggetto effettivo di sperimentazione	del campione complessivo di riferimento	di pazienti che non ricevono il trattamento oggetto di sperimentazione	nessuna delle precedenti	C

NUM	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISPOSTA CORRETTA
10	Quale delle seguenti è una modalità di trasmissione dell'HIV?	attraverso il sangue	attraverso i derivati del sangue	la via materno-fetale	tutte le alternative sono corrette	D
11	Quale di queste malattie si trasmette attraverso rapporti sessuali?	AIDS	gonorrea	sifilide	tutte le alternative sono corrette	D
12	Secondo il linguaggio della gestione e della organizzazione aziendale di tipo sanitario, il rapporto tra i risultati finali e gli obiettivi prestabiliti è detto:	raggiungimento di obiettivo	efficacia	qualità	efficienza	B
13	La definizione di focolaio epidemico si differenzia da quella classica di epidemia per il fatto che:	l'epidemia si è sviluppata improvvisamente in un contesto spaziale limitato	si sono manifestati solo uno o pochi casi di malattia in una popolazione nella quale tale patologia è normalmente assente	un agente patogeno persiste in una determinata popolazione causando un numero di casi di malattia che tende a mantenersi stabile nel tempo	l'epidemia si diffonde attraverso i continenti	A
14	La frattura di Colles è localizzata a livello di:	estremità distale del radio	estremità prossimale del femore	piede	bacino	A
15	La porpora si riscontra più frequentemente in caso di:	vasculopatia	trombocitosi	coagulopatia congenita	piastrinopenia	D
16	La pressione arteriosa diastolica di un adulto è:	80-190 mmHg	70-90 mmHg	40-60 mmHg	90-110 mmHg	B
17	La principale caratteristica delle ustioni di secondo grado è:	flittene	infezione virale	escara molle	diminuzione di tessuto necrotico	A
18	La reazione di rigetto del trapianto è causata da:	linfociti T del donatore	linfociti T del ricevente	globuli rossi del ricevente	linfociti B del donatore	B
19	La sede più comune negli arti inferiori in cui un embolo si arresta è:	femorale comune	femorale profonda	poplitea	tibiale anteriore	A
20	La terapia farmacologica per lo shock anafilattico prevede l'uso di:	diidralazina	valproato	cortisonici e adrenalina	dopamina	C

NUM	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISPOSTA CORRETTA
21	In caso di stravasamento, durante la somministrazione endovenosa di farmaci antitumorali, occorre immediatamente	interrompere la somministrazione	interrompere la somministrazione e attuare una fasciatura compressiva	rallentare il più possibile la velocità di somministrazione e chiamare il medico	interrompere la somministrazione del farmaco e aspirare il più possibile farmaco e sangue residui dal tubo o dal catetere	D
22	Se 250 mg di dobutamina vengono diluiti in 500 ml di soluzione, per rispettare la prescrizione medica di un dosaggio infusivo di 350mcg/minuto (21000 mcg/ora) per un paziente di 70kg l'infermiere dovrà impostare la velocità di infusione a:	1,66 ml/ora	100 ml/minuto	42ml/ora	84ml/ora	C
23	La velocità con cui viene fatta normalmente scorrere la carta dell'elettrocardiografo per eseguire un ECG standard è pari a:	25mm/s	30 mm/s	50cm/s	2cm/s	D
24	Nel caso si rompa accidentalmente una fiala contenente un farmaco ad azione stupefacente:	si attende la fine della giornata e a seguito di verifica di giacenza si opera lo scarico del materiale consumato sull'apposito registro	si provvede alla registrazione immediata dello scarico del farmaco sull'apposito registro segnalando l'evento	non si scarica il farmaco in quanto non utilizzato	si comunica l'evento al coordinatore che provvederà a registrarlo su apposito registro a fine mese	B
25	La lesione da pressione è al secondo stadio se è presente:	eritema fisso con cute integra non reversibile alla digitopressione	ferita a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma	ferita a tutto spessore che implica danno o necrosi del tessuto sottocutaneo fino allo strato muscolare	nessuna delle risposte è corretta	B

NUM	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISPOSTA CORRETTA
26	In caso di emiplegia o in presenza di apparecchio gessato o in infusione continua, quale è la tecnica da adottare nella svestizione della persona?	sfilare prima la manica dell'arto sano e poi la manica di quello limitato	sfilare prima la manica dell'arto limitato e poi la manica di quello sano	sfilare la manica indifferentemente da un arto o dall'altro	sfilare contemporaneamente le maniche	A
27	Nella gestione del catetere vescicale a permanenza quale delle seguenti applicazioni è da attuare?	esecuzione dell'urinocultura una volta alla settimana	mantenere il circuito catetere-sacca costantemente chiuso	sostituire il catetere settimanalmente	eseguire frequenti lavaggi vescicali	B
28	Per aiutare un soggetto a espettorare le secrezioni è utile:	garantire una corretta idratazione	umidificare l'ambiente	associare la posizione seduta a respiri profondi e colpi di tosse	tutte le risposte sono corrette	C
29	Ai pazienti con insufficienza renale cronica si addice una dieta povera di:	proteine	lipidi	frutta	zuccheri	A
30	In quale distretto va eseguita la paracentesi?	epigastrio	fossa iliaca sinistra	fossa iliaca destra	pancreas	B